



Centrum voor
Algemene Heelkunde

Dr. Tom Feryn



www.dokterferyn.be



Anale trombose

Wat is een perianale trombose of een trombose van de uitwendige aambeien?

Uitwendige aambeien zijn het gevolg van verwijding en zwelling van de meest uitwendig gelegen delen van het adersysteem rond de anus. In een gestuwde en gezwollen ader is het risico op stolling groot. Dit fenomeen van bloedstolling (trombose) kan dus vrij makkelijk in gestuwde uitwendige aambeien plaatsvinden. Dit wordt een perianale trombose genoemd.



Wat zijn de symptomen van een anale trombose?

Er ontstaat een blauw-paarse zwelling aan de rand van de anus. De perianaalthrombose kan wel het formaat hebben van een forse knikker. Vrijwel altijd is er sprake van een ernstige, allesoverheersende pijn. Problemen met de ontlasting zijn vaak het gevolg van deze pijn.

Wat is de oorzaak van een anale trombose?

Hoewel de perianale trombose geen zeldzaam probleem is, is er nog veel onduidelijk over het ontstaansmechanisme dat leidt tot de trombose. Een van de factoren die een rol lijken te spelen is obstipatie.

Behandeling

Conservatief

Een groot deel van de perianale trombosen zal vanzelf weer verdwijnen, al dan niet ondersteund door dieetaanpassingen (extra vezels) en pijnstillende (zalf)therapie.



anale trombose



vezelrijke voeding



anale trombose

Operatief

Meestal zal echter toch gekozen worden voor een operatieve ingreep. De perianaal trombose kan worden ingesneden en het gestolde bloed kan worden verwijderd. Deze ingreep onder lokale verdoving geeft een onmiddellijke verlichting van de pijn. Een volledige operatieve verwijdering van de perianaal trombose geeft de beste resultaten op langere termijn.



insnede van een anale trombose



Wanneer moet u uw chirurg contacteren?

Naast de postoperatieve controle waarop u wordt uitgenodigd, moet u absoluut in volgende gevallen uw arts contacteren :

- bij aanhoudende koorts
- in geval van koude rillingen
- bij hevige anale pijn
- in geval van bloedverlies met klonters

Controle

Er wordt voor u een afspraak gemaakt voor controle op de polikliniek. Meestal is dat enkele dagen na de operatie. De wonde wordt dan nagekeken.

Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelende arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw chirurg aan u kenbaar gemaakt worden. Indien u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u steeds contact opnemen met uw huisarts of kunt u bellen naar de polikliniek Algemene Heelkunde.

Het medisch en verpleegkundig team van het Centrum voor Algemene Heelkunde wenst u alvast een spoedig herstel.



Centrum voor Algemene Heelkunde - Dr. Tom Feryn

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Ruddershove 10

8000 Brugge

Tel. 050 45 25 60

Fax. 050 45 25 71

algemene.heelkunde@azsintjan.be

Centrum voor Algemene Heelkunde

Snependreef 2

8200 Sint-Michiels

Tel. 050 69 63 60

Fax. 050 69 63 80

info@dokterferyn.be

www.proctologiekliniek.be

www.facebook.com/dokertomferyn

www.youtube.com/dokertomferyn

www.youtube.com/proctologie